Лекарства, применяемые при туберкулёзной инфекции

Developed by the
Minnesota Department of Health,
Tuberculosis Prevention and Control Program
August 2002 phone: (612) 676-5414

This is one in a series of four patient education pamphlets that addresses TB to be used in various clinical situations.

Medicine for Tuberculosis Infection, Russian

Туберкулёзная инфекция

Медицинский работник определил, что Вы являетесь носителем туберкулёзной инфекции. Вам рекомендуется принимать лекарство для профилактики заболевания туберкулёзом.

Когда-то Вы вдохнули микробы туберкулёза в лёгкие. Ваш организм препятствует размножению микробов, или возникновению заболевания. Микробы находятся в организме в неактивном состоянии, но они остаются живыми, не вызывая болезни. Вы не заразны для окружающих. Это называется **туберкулёзной инфекцией.**

Лекарство может предотвратить возникновение туберкулёза

Если Вы, являясь носителем туберкулёзной инфекции, не будете принимать лекарство, Вы можете заболеть туберкулёзом. В таком случае Вы становитесь заразным для окружающих. Лекарство может предотвратить возникновение болезни путём уничтожения микробов туберкулёза. Такое лекарство является профилактическим лечением.

Примите полный курс лечения, как предписано

Профилактическое лечение

Изониазид (Isoniazid; INH) - это лекарство, которое обычно выписывается как профилактическое лечение. Оно уничтожает микробы туберкулёза в организме. **Изониазид необходимо принимать точно по предписанию,** иначе он не будет э ффективным для профилактики туберкулёза.

Вам нужно будет посещать врача как минимум раз в месяц в процессе профилактического лечения, чтобы убедиться, что Ваш организм воспринимает лекарство без побочных эффектов.

Изониазид может вызывать побочные эффекты. Немедленно поставьте в известность врача или медсестру, если у Вас возникнут какие-нибудь из нижеперечисленных симптомов:

- тошнота
- рвота
- потеря аппетита
- необычная утомляемость
- боль в брюшной полости
- цвет мочи темнее обычного
- появление жёлтой окраски кожи или глаз
- повышенная температура, держащаяся в течение трёх дней или дольше
- ощущение покалывания в кистях рук или ступнях
- кожная сыпь

Употребление алкогольных напитков (вина, пива и более крепких спиртных напитков) в процессе лечения изониазидом повышает риск возникновения побочных эффектов. Более подробную информацию об этом можно получить у медицинского работника.